

NOTE SUR QUELQUES OISEAUX DE L'ÉQUATEUR ORIENTAL,

PAR M. J. BERLIOZ.

La Collection d'Oiseaux du Muséum vient de s'enrichir, grâce à M. Clavery, Consul de France à Quito (Équateur), de quelques espèces intéressantes provenant de la région orientale de l'Équateur. On sait que cette région, comprise dans le bassin du Haut-Amazone, sur les pentes orientales de la Cordillère des Andes, possède une faune ornithologique nettement différente de celle du versant occidental de cette chaîne et de la région bien connue de Quito : souvent les mêmes genres sont représentés par des espèces voisines, mais nettement différentes, sur ces deux versants. C'est une zone de forêts équatoriales, dont la température, tout au moins dans les vallées, est à peu près constante et oscille aux environs de 25° et 26°.

La faune ornithologique du bassin du Haut-Amazone est une des plus brillantes de l'Amérique du Sud, en même temps qu'une des plus intéressantes, car les difficultés d'accès et les désagréments du climat équatorial ne favorisent guère les recherches dans cette région. La plupart des Oiseaux y ont une aire d'habitat étendue, sans doute à cause de la grande uniformité des conditions climatiques et biologiques de toute cette région haute-amazonienne, la plus luxuriante sans doute, sous le rapport de la végétation, du monde entier. Aussi les mêmes espèces se retrouvent généralement sur le versant oriental péruvien et en Équateur, souvent même jusqu'en Bolivie au Sud, jusqu'au Vénézuëla et en Guyane au Nord.

Les Oiseaux envoyés par M. Clavery proviennent des localités de Canelos et de Sarayacu, situées toutes deux sur le Bobonaza, affluent du Rio Pastaza, lui-même tributaire de l'Amazone. Leur altitude n'est respectivement que de 1,000 mètres et 800 mètres au-dessus du niveau de la mer : leur faune ne présente donc aucun caractère de faune d'altitude et est proprement significative de la forêt équatoriale.

*Icterus croconotus* (Wagl.). — Un ad. de Canelos [nom indigène : Curillo]; — cette espèce représente le Carouge jamacai dans l'intérieur de l'Amérique du Sud, depuis la Guyane jusqu'à l'Équateur et la Bolivie. C'est un bel oiseau, au plumage orange vif et noir ; comme beaucoup d'autres de la même famille, il s'apprivoise aisément et est tenu en captivité à cause non seulement de son brillant plumage, mais aussi de son chant agréable.

*Euphonia xanthogaster* Sund. — Un ♂ ad., de Canelos ; — très répandu dans une grande partie de l'Amérique du Sud.

*Tanagrella iridina* Hartl. — Un ad., de Canelos [nom indig. : Cecilia-pishco] ; — propre au versant oriental des Andes, du Pérou en Colombie.

*Tanagrella calophrys* (Cab.). — Trois ad., de Canelos ; — bien reconnaissable à son large bandeau frontal vert bleuâtre ou nacré brillant, ce joli Tangara est éminemment caractéristique de l'Équateur oriental et des régions limitrophes du Haut-Amazone.

*Calospiza chilensis* (Vig.). — Nombreux spécimens, ad. et imm., de Canelos.

*Calospiza Schranki* (Spix). — Deux ad., deux imm., de Canelos ; — comme la précédente, cette espèce paraît essentiellement propre aux pentes orientales du système andin, depuis la Bolivie jusqu'à l'Équateur.

*Calospiza xanthogaster* (Scl.). — Deux ad., de Canelos ; — habite tout le bassin amazonien, depuis le Pérou jusqu'en Guyane.

*Calospiza gyroloides* (Laf.). — Deux ad., de Canelos ; — la forme amazonienne de cette espèce (*C. delecticia* Bangs) n'est pas sensiblement différente du type de l'Amérique centrale.

*Calospiza boliviana* (Bp.). — Deux ad. de Canelos ; — espèce propre au versant oriental des Andes, de la Bolivie jusqu'en Colombie.

*Calospiza nigricincta* (Bp.). — Deux ad., de Canelos ; — cet oiseau est répandu dans tout le bassin amazonien, depuis la Bolivie jusqu'en Colombie et en Guyane, sans être très commun nulle part apparemment.

*Calospiza cyaneicollis cæruleocephala* (Sw.). — Quatre ad. et imm., de Canelos ; — espèce également très répandue sur le versant oriental des Andes.

*Rhamphocælus nigrigularis* (Spix). — Six ad., de Sarayacu [nom indig. : Uchopishco] ; — belle espèce, caractéristique de la Haute-Amazone, Pérou et Équateur orientaux.

*Cyanerpes cæruleus* (L.). — Un ad., de Canelos ; — espèce très répandue en Amérique du Sud et dont on a cru devoir distinguer, sans raison bien fondée, plusieurs variétés peu distinctes.

*Dacnis cayana* (L.). — Deux ad., de Sarayacu ; — bel oiseau, répandu dans tout le bassin nord de l'Amazone depuis les Guyanes jusqu'à la région andine.

*Cotinga maynana* (L.). — Six ad., de Sarayacu [nom indig. : Llushan] ; — plus localisé que le précédent et essentiellement caractéristique des pentes orientales des Andes, au Pérou et en Équateur, où il paraît néan-

moins assez commun. Le plumage de cette magnifique espèce a une distribution de couleurs analogue à celle du *Cot. cayana*, mais il est plus brillant et la base des plumes est blanche, tandis qu'elle est noire chez son congénère.

*Topaza pyra* Gould. — Deux ♂ ad., de Sarayacu [nom indig. : Yayuquinde]; — ce bel Oiseau-Mouche, proche parent du «Colibri Topaze» de Cayenne, est une des gemmes de la faune ornithologique du Haut-Amazone. Il n'est connu que du Rio Negro et de l'Équateur oriental, où les indigènes le considèrent, paraît-il, comme rare.